



Consortium canadien
**d'intervention précoce
pour la psychose**



OPTIONS DE TRAITEMENT

POUR LA PRISE EN CHARGE DE LA SCHIZOPHRÉNIE ET DE SES SYMPTÔMES

COMPRENDRE LE RÔLE DE LA MÉDICAMENTATION ET LES DIFFÉRENTS TYPES D'ANTIPSYCHOTIQUES

Les médicaments sont un seul aspect du traitement de la schizophrénie, mais c'en est un important. Les médicaments pour le traitement de la schizophrénie sont appelés «antipsychotiques». Bien qu'ils ne puissent pas complètement guérir la maladie, ils peuvent **aider à contrôler les symptômes et à prévenir les rechutes**.

Il y a deux différents types d'antipsychotiques :



Les antipsychotiques de première génération sont également connus sous le nom d'antipsychotiques «traditionnels». Comme leur nom l'indique, les médicaments de cette catégorie furent les premiers à être développés pour traiter la schizophrénie. **Ils peuvent aider les symptômes positifs**, tels que les hallucinations, les délires et la paranoïa.



Les antipsychotiques de deuxième génération (aussi connus sous le nom de «nouveaux» ou d'«atypiques») ont été développés plus récemment. **Ils peuvent aider les symptômes positifs et négatifs**, comme la dépression, le retrait et la difficulté de planification et d'organisation. Ils offrent également un risque inférieur de certains effets reliés au mouvement.

Les antipsychotiques varient aussi sur la façon dont on les prend :



Les **antipsychotiques par voie orale** sont pris par la bouche **chaque jour** (sous forme de pilule).



Les antipsychotiques injectables à longue durée d'action («APAP») sont administrés par injection. Ils peuvent être donnés **toutes les 2 semaines, 1 fois par mois ou tous les 3 mois** (4 fois par année), selon l'option que vous et votre médecin choisirez. Plusieurs personnes choisissent les APAP comme une façon plus pratique de prendre leur médication.

Rappelez-vous : les antipsychotiques ne peuvent faire leur travail que s'ils sont pris tels que prescrits! Aidez votre proche à respecter son plan de traitement en lui rappelant comment leur médicament l'aide (ou pourrait l'aider) avec ses symptômes spécifiques, et peut l'aider à atteindre ses objectifs.*

***Note :** Les effets secondaires de la médication peuvent souvent avoir des répercussions négatives sur la qualité de vie de votre proche. Il est important que votre proche dresse une liste qui décrit clairement comment chaque effet secondaire interfère avec sa satisfaction dans la vie. Il est important que le médecin reconnaisse les répercussions et reçoive les inquiétudes de votre proche, et aborde des façons de les prendre en charge.

ANTIPSYCHOTIQUES OFFERTS AU CANADA :




Antipsychotiques par voie orale, de première génération, à prise unique quotidienne :

- Clopixol® (zuclopenthixol)*
- Fluanxol® (flupentixol)*
- Haldol® (halopéridol)*
- Largactil® (chlorpromazine)
- Loxapac® (loxapine)
- Majeptil® (thiopropérazine)
- Modecate® (fluphénazine)*
- Navane® (thiothixène)
- Neuleptil® (périciazine)
- Nozinan® (méthotriméprazine)
- Orap® (pimozide)
- Stélazine® (trifluopérazine)
- Stémétil® (prochlorpérazine)
- Trilafon® (perphénazine)

Antipsychotiques par voie orale, de deuxième génération, à prise unique quotidienne :

- Abilify® (aripiprazole)
- Clozaril® (clozapine)
- Invega® (palipéridone)
- Latuda® (lurasidone)
- Risperdal® (rispéridone)
- Saphris® (asénapine)
- Séroquel® (quétiapine)
- Zeldox® (ziprasidone)
- Zyprexa® (olanzapine)



Antipsychotiques injectables à longue durée d'action, de deuxième génération :

À prendre toutes les 2 semaines :

- Risperdal® Consta® (rispéridone)

À prendre mensuellement :

- Abilify Maintena® (aripiprazole à libération prolongée)
- Invega Sustenna® (palmitate de palipéridone)

À prendre tous les 3 mois

(4 fois par année) :

- Invega Trinza® (palmitate de palipéridone)

*Aussi offert en formulation **injectable à longue durée d'action** à prendre toutes les 2 à 4 semaines.

Parlez à votre médecin à propos de l'antipsychotique qui serait le mieux pour vous ou pour votre proche, car tous les antipsychotiques ne sont pas appropriés pour tous. Parlez ouvertement de toute inquiétude à propos de la médication, ou des effets secondaires que vous éprouvez.



Note : Cette liste peut ne pas inclure toutes les options offertes. Des formulations génériques de certains des antipsychotiques ci-dessus peuvent être également offertes. Toutes les marques de commerce enregistrées sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

APPROCHES SUPPLÉMENTAIRES POUR TRAITER LA SCHIZOPHRÉNIE

Bien que les antipsychotiques soient une partie importante du traitement de la schizophrénie, la médication n'est pas la seule étape en vue de contrôler cette maladie. Le **traitement non pharmacologique** est un autre élément important du traitement de la schizophrénie, car cela peut vous aider, et votre proche, à comprendre comment mieux prendre en charge les symptômes et améliorer le fonctionnement global.



La psychothérapie peut inclure :

Réhabilitation :

- Peut impliquer du soutien à l'emploi ou à l'éducation pour aider les individus à atteindre leurs objectifs personnels.

Thérapie :

- Certaines personnes peuvent bénéficier d'une thérapie et de soutien en ce qui concerne la consommation de drogues et d'alcool.

Thérapie cognitivo comportementale :

- Ce type de psychothérapie aide les individus à développer des habiletés pour prendre en charge un grand éventail de symptômes.

Éducation de la famille :

- Éduquer les membres de la famille sur la maladie et le traitement aide ceux-ci à jouer un rôle essentiel dans les soins de leur proche.

Pour plus d'information sur la vie avec la psychose, et comment aider un proche atteint de schizophrénie, visitez www.earlypsychosisintervention.ca.



A REASON TO HOPE. THE MEANS TO COPE.
SCHIZOPHRENIA SOCIETY OF CANADA
SOCIÉTÉ CANADIENNE DE LA SCHIZOPHRÉNIE
UNE SOURCE D'ESPOIR, DE SOUTIEN ET D'ENTRAIDE.

Consortium canadien d'intervention précoce pour la psychose
118 James Street North, Bureau 200 • Hamilton (Ontario), L8R 2K7
Téléphone : 905-525-8213 • Télécopieur : 866-714-5521 • www.ippcanada.org